

Liste des traitements et gestes effectués au Centre de Perfusion des Pâquis

Traitements

- Tous les antibiotiques ou antifongiques (limitation : dose maximale 2x/j)
- Anticorps monoclonaux
 - Alemtuzumab (Lemtrada®)
 - Bélimumab (Benlysta®)
 - Infliximab (Inflectra®, Remicade®, Remsima®)
 - Natalizumab (Tysabri®)
 - Ocrelizumab (Ocrevus®)
 - Omalizumab (Xolair®)
 - Reslizumab (Cinqaero®)
 - Rituximab (Mabthera®, Rixathon®)
 - Sotrovimab (Xevudy®)
 - Tocilizumab (Actemra®)
 - Ustekinumab (Stelara®)
 - Védolizumab (Entyvio®)
- Biphosphonates
 - Acide inbandronique (Bonviva®)
 - Acide zolédronique (Zoledronate Osteo® (équivalent Aclasta®))
- Corticostéroïdes
 - Méthylprednisolone (Solu-Medrol®)
- Immunoglobulines (Kiovig®, Privigen®)
- Immunosuppresseur sélectif
 - Abatacept (Orencia®)
- Modulateurs des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate
 - Fingolimod (Gilenya®)
- Transfusion de culot érythrocytaire
- Transfusion de plaquettes
- Traitements dépôts (si patient le prend avec lui).
- Traitements ferriques
 - Déféroxamine mésilate (Desferal®)
 - Fer III et carboxymaltose (Ferinject®)
 - Fer III et saccharose (Venofer®)
- Traitements vitaminiques
 - Vitamine B12 (Vitarubin®)
 - Thiamine (Benerva®)
- Vaccins (si patient le prend avec lui)

Gestes

- Ponctions lombaires
- Ponctions d'ascite
- Pose de PICC Line
- Saignées
- Test au synacthen
- Test JS Virus
- Prise de sang
- Réalisation ECG
- Réalisation de Remler (MAPA)
- Changement pansements Midline, PICC Line