

LE RETOUR À LA MAISON

- **Donner des médicaments pour faire baisser la fièvre** ou calmer les maux de gorge.
- Encourager votre enfant **à boire**

A savoir que les **symptômes généraux du faux-croup peuvent encore durer quelques jours**. Il se peut que votre enfant fasse plusieurs crises de faux-croup dans la même saison.

PRÉVENTION

- **Eviter de surchauffer la chambre** de l'enfant
- **Renoncer de fumer dans le logement**

CONTACT

EHC - HÔPITAL DE MORGES

Chemin du Crêt 2
CH – 1110 Morges
Tél. 021 804 22 11

LE FAUX-CROUP

Informations aux parents



DÉFINITION

Le faux-croup est une infection virale qui cause une inflammation du larynx et de la trachée. Cela cause un œdème des voies respiratoires.

Le faux-croup atteint le plus souvent les enfants entre 6 mois et 4 ans.

Il débute souvent avec un refroidissement comme un rhume, de la fièvre, des maux de gorge et une diminution de l'appétit.

LES SYMPTÔMES

Les symptômes sont :

- **une difficulté respiratoire**
- **un enrouement**
- **une toux sèche et aboyante**
- **un bruit rauque à l'inspiration, appelé stridor.**

La difficulté respiratoire est causée par le gonflement des voies respiratoires.

Les symptômes sont souvent plus importants la nuit.

LE TRAITEMENT À LA MAISON

- **Garder son calme**
- **Donner des médicaments pour faire baisser la fièvre**
- Stimuler votre enfant **à boire**
- Aller sur le balcon avec votre enfant ou se tenir devant une fenêtre ouverte. **L'air frais a également un effet calmant.**

CONSULTATION AUX URGENCES

Si le traitement ci-dessus n'améliore pas les symptômes, et que les problèmes respiratoires augmentent, ou si le stridor persiste même quand votre enfant est calme, qu'il ne boit plus et qu'il est particulièrement calme, une consultation est nécessaire chez le pédiatre ou aux urgences pédiatriques.

Si les lèvres de votre enfant deviennent bleues il convient d'appeler le 144 (Urgences santé).

LE TRAITEMENT À L'HÔPITAL

- **L'enfant reçoit un médicament à base de cortisone** afin de diminuer l'inflammation des voies respiratoires.

Si les difficultés respiratoires sont importantes, il recevra un aérosol. Il devra rester 6 heures en observation.

