

Utilisation de la chambre d'inhalation

Informations patient



CONTACT

EHC - HÔPITAL DE MORGES

Chemin du Crêt 2
CH – 1110 Morges

Tél. 021 804 22 11

Votre enfant est sous médicament aérosol-doseur

Ventolin® : bronchodilatateur, qui permet d' « ouvrir les bronches »

et sa chambre d'inhalation.



Déroulement

Bien agiter le Ventolin®. Retirer le capuchon et l'insérer dans la chambre d'inhalation.

Positionner le masque hermétiquement autour de la bouche de l'enfant. Vérifier que l'enfant soit positionné confortablement, de préférence bien assis.



Faire un push de Ventolin® tout en maintenant le masque sur le visage. Compter 10 respirations. Si besoin refaire un push du même médicament et compter 10 respirations.

Remarque

Si votre enfant a besoin d'un autre médicament aérosol doseur, attendre quelques secondes entre les deux médicaments, bien agiter l'aérosol doseur et répéter la procédure.

Vérification le contenu aérosol doseur



Retirer la cartouche de l'embout
Peser la cartouche afin de savoir si la quantité de médicament est suffisante

Poids	Doses restantes	Quantité
28 g	200	plein
25 g	150	¾ plein
21 g	100	½ plein
18 g	50	¼plein : Penser à changer le Ventolin®, demander une ordonnance
16 g	0	Vide : jeter le Ventolin®

Entretien de la chambre d'inhalation



Si la chambre d'inhalation est en plastique, laver une fois par semaine la chambre d'inhalation : faire tremper les pièces (retirer uniquement la pièce arrière) durant 15 minutes dans de l'eau avec du savon.

Rincer uniquement le masque et laisser sécher les pièces à l'air (ne pas essuyer).

Choix de l'aérochamber

Enfant de 0 à 1 an

Enfant de 1 à 5 ans

Enfant de plus de 5 ans

